

INFORMATION OM OPERATION I ANSIGT

Efter operationen kan der komme smerter i operationsområdet.

Hvis du har behov for smertestillende, kan du tage Panodil i sædvanlig dosis dvs. 1½-2 tabletter ved behov max 4 x dagligt. Der forventes kun smerter samme dag.

Hvis du er opereret i eller nær munden, tilrådes det at spise kold og flydende kost det første døgn. Herefter gradvis overgang til normal kost i løbet af nogle dage.
Hvis det bløder så hold noget is på området.

Hold operationsområdet højt og skån det. Undgå cremer og anden kosmetik i området.
Den ydre forbindelse (plaster og gaze) kan fjernes dagen efter. Plastre under gazen skal blive siddende.

Når der er gået 24 timer efter operationen, må du bade. Brus til slut arret over med rent vand og dup det med et rent håndklæde.

Vær opmærksom på tegn til betændelse: Tiltagende ømhed, rødme, evt. snask fra såret. Da bedes du kontakte os.

Du bedes kontakte os ved blødning udover en smule på forbindingen

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis der opstår spørgsmål.

Vævet, der er fjernet, sendes til mikroskopisk undersøgelse, og svar herpå forventes i løbet af max 3 uger.